

Chronische Nierenkrankheit: Modifiziertes KDIGO-Risikomodell mit Farbdarstellung

				Stadien der persistierenden Albuminurie		
				A1	A2	A3
				normal bis leichtgradig eingeschränkt	mäßiggradig eingeschränkt	hochgradig eingeschränkt
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
GFR Stadien (ml/min)	G1	normal oder hoch	>90	0,04	0,31-0,44	0,72-0,8
	G2	leichtgradig eingeschränkt*	60-89	0,04	0,15-0,29	1,9-2,68
	G3a	leicht- bis mäßiggradig eingeschränkt	45-59	0,28-0,88	1,6	5,88
	G3b	mäßig- bis hochgradig eingeschränkt	30-44	2,24-2,96	11,76	30,52
	G4	hochgradig eingeschränkt	15-29	17,32-41,76	42,24	91,44
	G5	Nierenversagen	<15			

Die Zahlen sind aus Quellpublikationen errechnet. Sie geben das Risiko eines Nierenversagens pro 1.000 Patient*innen für den Zeitraum von 1 Jahr an.

Grün: niedriges Risiko

Gelb: moderat erhöhtes Risiko

Orange: hohes Risiko

Rot: sehr hohes Risiko

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Versorgung von Patient*innen mit chronischer, nicht-nierenersatztherapiepflichtiger Nierenkrankheit in der Hausarztpraxis. AWMF-Leitlinie Nr. 053-048. S3, Stand 2024. Abb. 4 auf S. 77.